


1 関数 $y = 2^x$ および $y = 3^x$ について次の表にあてはまる y の値を小数で表せ. ただし, $2^{0.5} = 1.414$, $3^{0.5} = 1.732$ とする. ヒント: $2^{-0.5} = 2^{0.5} \times 2^{-1} = 1.414 \div 2 = 0.707$ であることなどに注意せよ.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|------|----|------|----|------|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| x | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 2^x | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|------|----|------|----|------|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| x | -3 | -2.5 | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 3^x | | | | | | | | | | | | | |


2 前問を利用して, 指数関数 $y = 2^x$ と $y = 3^x$ のグラフを描け. また, それぞれのグラフの $(0, 1)$ における接線をなるべく正確に引き, その傾きを推定せよ.



3 関数 $y = e^x$ について, いろいろな x に対する y の値は次の表のようになる.

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x | -2 | -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| e^x | 0.1353 | 0.2231 | 0.3679 | 0.6065 | 1.0000 | 1.6487 | 2.7183 | 4.4817 | 7.3891 | 12.183 |

これを利用して, 指数関数 $y = e^x$ のグラフを描き, それぞれのグラフの $(0, 1)$ における接線を引いてみよ.
 また, 対数関数 $y = \log x$ は $y = e^x$ の逆関数であることを用い, $y = \log x$ のグラフを描き, $(1, 0)$ における接線を引いてみよ.



4 対数関数 $\log x$ は指数関数 e^x の逆関数である。すなわち、 $f(x) = e^x$ とすると、 $f^{-1}(x) = \log x$ である。このことと逆関数の微分公式を用いて $(\log x)'$ をもとめよ。

5 $a = e^{\log a}$ であることを用いて $(a^x)'$ をもとめよ。

6 $f(x)$ を任意の関数とするととき $(\log f(x))'$ をもとめよ。

7 関数 $f(x)$ の導関数 $f'(x)$ が微分可能であるとき、 $f'(x)$ の導関数を $f(x)$ の第 2 次導関数といい、 $f''(x)$ で表す。 $f(x)$, $g(x)$ の第 2 次導関数が存在するとき、次の式が成り立つことを示せ。

$$(f(x)g(x))'' = f''(x)g(x) + 2f'(x)g'(x) + f(x)g''(x)$$

8 次の各々の関数の導関数を求めよ。

a) $f(x) = x^3 3^{-x}$

$$f'(x) =$$

b) $f(x) = e^{\sqrt{x}}$

$$f'(x) =$$

c) $f(x) = \log(x + \sqrt{x^2 + 3})$

$$f'(x) =$$

d) $f(x) = e^x \log x$

$$f'(x) =$$