入学年度	学部	学 科	組	番 号	検	フリガナ
						氏 名

$\boxed{1}$ $f(x) = x^4 + \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - x - 2$ とする.

a) $f(x)$ の導関数 $f'(x)$ と 2 次導関数 $f''(x)$ を求めよ.

$f'(x) = 4x^3 + x^2 - 4x - 1$
$f''(x) = 12x^2 + 2x - 4$

b) $f'(x) = 0$ となる x を求めよ．また， $f'(x) > 0$ となる x の範囲を求めよ.

$f'(x) = 4x^3 + x^2 - 4x - 1 = (4x+1)(x-1)(x+1)$ より， $f'(x) = 0$ の解は $x = -\frac{1}{4}, -1, 1$

$f'(x) = (4x+1)(x-1)(x+1) > 0$ を解くと， $-1 < x < -\frac{1}{4}, x > 1$

c) $f''(x) = 0$ となる x を求めよ．また， $f''(x) > 0$ となる x の範囲を求めよ.

$f''(x) = 12x^2 + 2x - 4 = 2(6x^2 + x - 2) = 2(3x+2)(2x-1) = 0$ より， $f'(x) = 0$ の解は $x = -\frac{2}{3}, \frac{1}{2}$

$f''(x) = 2(3x+2)(2x-1) > 0$ を解いて， $x < -\frac{2}{3}, x > \frac{1}{2}$

d) $f(x)$ の増減表を完成させよ．（増減だけでなくグラフの凹凸も調べること．）

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	$-\frac{2}{3}$	$\cdots$	$-\frac{1}{4}$	$\cdots$	$\frac{1}{2}$	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	↘	極小	↗	変曲点	↗	極大	↘	変曲点	↘	極小	↗

$\boxed{2}$ $f(x) = (x-1)e^{x+1}$ とする.

a) $f(x)$ の導関数 $f'(x)$ と 2 次導関数 $f''(x)$ を求めよ.

$f'(x) = (x-1)'e^{x+1} + (x-1)\left(e^{x+1}\right)' = e^{x+1} + (x-1)e^{x+1} = xe^{x+1}$
$f'(x) = (x)'e^{x+1} + x\left(e^{x+1}\right)' = e^{x+1} + xe^{x+1} = (x+1)e^{x+1}$

b) $f'(x) = 0$ となる x を求めよ．また， $f'(x) > 0$ となる x の範囲を求めよ.

e^{x+1} の値は常に正だから， $f'(x) = xe^{x+1} = 0 \Leftrightarrow x = 0$
$f'(x) = xe^{x+1} > 0 \Leftrightarrow x > 0$

c) $f''(x) = 0$ となる x を求めよ．また， $f''(x) > 0$ となる x の範囲を求めよ.

前問と同様に， $f''(x) = (x+1)e^{x+1} = 0 \Leftrightarrow x = -1$
$f'(x) = (x+1)e^{x+1} > 0 \Leftrightarrow x > -1$

d) $f(x)$ の増減表を完成させよ．（増減だけでなくグラフの凹凸も調べること．）

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$f''(x)$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	変曲点	↘	極小	↗

e) $f(x)$ が極大・極小となる点，および変曲点を求めよ.

極大となる点：　なし
極小となる点：　$x = 0$
変曲点：　$(-1, -2)$

$\boxed{3}$ $f(x) = 4xe^{-\frac{x^2}{2}}$ とする.

a) $f(x)$ の導関数 $f'(x)$ と 2 次導関数 $f''(x)$ を求めよ.

$$f'(x) = 4(x)'e^{-\frac{x^2}{2}} + 4x\left(e^{-\frac{x^2}{2}}\right)' = 4e^{-\frac{x^2}{2}} + 4xe^{-\frac{x^2}{2}}\left(-\frac{x^2}{2}\right)' = 4e^{-\frac{x^2}{2}} + 4xe^{-\frac{x^2}{2}}(-x)$$

$$= 4(1-x^2)e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$f''(x) = 4(1-x^2)'e^{-\frac{x^2}{2}} + 4(1-x^2)\left(e^{-\frac{x^2}{2}}\right)' = 4(-2x)e^{-\frac{x^2}{2}} + 4(1-x^2)e^{-\frac{x^2}{2}}(-x)$$

$$= 4x(x^2-3)e^{-\frac{x^2}{2}}$$

b) $f'(x) = 0$ となる x と, $f'(x) > 0$ となる x の範囲を求めよ.

$e^{-\frac{x^2}{2}}$ は常に正だから,
$f'(x) = 0 \iff (1-x^2) = 0 \iff x = 1, -1$
$f'(x) > 0 \iff (1-x^2) > 0 \iff -1 < x < 1$

c) $f''(x) = 0$ となる x と, $f''(x) > 0$ となる x の範囲を求めよ.

$f''(x) = 0 \iff x(x^2-3) = 0 \iff x = 0, -\sqrt{3}, \sqrt{3}$
$f''(x) > 0 \iff x(x^2-3) > 0 \iff -\sqrt{3} < x < 0, x > \sqrt{3}$

d) $f(x)$ の増減表を完成させよ. (増減だけでなくグラフの凹凸も調べること.)

x	$\cdots$	$-\sqrt{3}$	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$	$\sqrt{3}$	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$
$f''(x)$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	変曲点	↘	極小	↗	変曲点	↗	極大	↘	変曲点	↘

e) $f(x)$ が極大・極小となる点, および変曲点を求めよ.

極大となる点： $x = 1$
極小となる点： $x = -1$
変曲点： $(-\sqrt{3}, -4\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}}), (0,0), (\sqrt{3}, 4\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$

f) $e^{-\frac{1}{2}} \fallingdotseq 0.607$, $e^{-\frac{3}{2}} \fallingdotseq 0.223$, $e^{-2} \fallingdotseq 0.135$, $e^{-\frac{9}{2}} \fallingdotseq 0.011$ であるとして, $f(\pm1), f\left(\pm\sqrt{3}\right), f(\pm2)$, $f(\pm3)$ の値を概算せよ.

$f(\pm1) = \pm2.428,\ f\left(\pm\sqrt{3}\right) = 1.545,\ f(\pm2) = 1.08,\ f(\pm3) = 0.132$

g) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0$ であることが知られている. これと, ここまでの結果を用いて, $f(x)$ のグラフをなるべく丁寧に描け.



担当：鍬田 政人 (kuwata.04f@g.chuo-u.ac.jp)

中央大学